

Avertissements agricoles



Bulletin n° 23 du 15 septembre 1987

Numérotation continue : n° 51

COLZA :

- . Placez vos cuvettes jaunes !
- . Surveillez les limaces
- . Desherbage anti-graminées

CEREALES :


- . Desherbage de pré-levée

COLZA :**- Mise en place des cuvettes jaunes :**


Avant la levée, placez les cuvettes jaunes dans vos colzas. Elles vous permettent de repérer l'arrivée des premiers insectes dans la parcelle. La cuvette doit être déposée en respectant quelques règles élémentaires précises (voir fiche "ravageurs du colza" accompagnant le bulletin n° 50).

- Premier insecte à surveiller : la grosse altise

- . Période de sensibilité : de la levée au stade 3 feuilles vraies.

**. Grosse altise adulte :**

Taille réelle 3-4 mm - Bleu vert à reflet métallique

**. Dégâts d'altises :**

Morsures des cotylédons et des jeunes feuilles pouvant entraîner la destruction du pied de colza

. Le seuil d'intervention est de : 20 à 30 captures cumulées après le stade B2 (2 feuilles vraies étalées ou déployées) ou 3 pieds sur 10 présentant des morsures avant le stade B2.

Il est trop tôt pour intervenir.

ATTENTION : Ne pas confondre les morsures d'altises avec les dégâts de limaces.

. Dégâts de limaces : Feuilles déchiquetées avec présence de bave.



778

COMMUNIQUE : Comme les années précédentes, M. HOMMAY travaille toujours sur le problème limaces et attend vos appels au **89.41.11.68.** dès que vous observerez des dégâts de limaces dans vos parcelles.

INRA - Station de Zoologie
B.P. 507 - 28, rue Herrlisheim
68021 COLMAR CEDEX.

- Desherbage anti-graminées de post-levée :

La concurrence des graminées peut être très préjudiciable au colza ; il est donc conseillé de les desherber le plus tôt possible avant l'hiver. Vous pouvez utiliser l'un des produits suivants :

	Matière active	Spécialité commerciale	Dose/ha de spécialité	OBSERVATIONS
P O S T - L E V E E	alloxydime-sodium	FERVIN + huile	1 kg + 3 l d'huile	<ul style="list-style-type: none"> . Quel que soit le stade du colza . De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées . Application de préférence sur végétation active (en soirée si temps sec) . Action essentiellement sur graminées (sauf paturin) . Contre graminées vivaces
			1 kg à 1,25 kg + 3 l d'huile	
	sethoxydime	FERVINAL	2 l + 3 l d'huile	<ul style="list-style-type: none"> . Quel que soit le stade du colza . De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées . Application de préférence sur végétation active (en soirée si temps sec) . Action essentiellement sur graminées (sauf paturin) . Contre graminées vivaces
			3 l + 3 l d'huile Schering	
	fluazifop-butyl	FUSILADE X 2 + AGRAL	0,75 l + 0,1 % vol. AGRAL	<ul style="list-style-type: none"> . Quel que soit le stade du colza . De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées . Application de préférence sur végétation active (en soirée si temps sec) . Très bonne efficacité sur graminées . Contre graminées vivaces
			1,5 L + AGRAL (0,1 %)	
	haloxyfop-éthoxyéthyl	GALLANT	1,0 l	<ul style="list-style-type: none"> . Quel que soit le stade du colza . De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées . Uniquement à l'automne . Application de préférence sur végétation active (en soirée si temps sec) . Action essentiellement sur graminées . Contre graminées vivaces et paturin
			2,0 l	
	quizalofop-éthyl	TARGA + huile	1,25 l + 2,0 l	<ul style="list-style-type: none"> . Quel que soit le stade du colza . De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées . Application de préférence sur végétation active (en soirée si temps sec) . Action essentiellement sur graminées (sauf paturin) . Contre les graminées vivaces et paturin au stade 1 à 3 feuilles maximum
			3 l + 8 l huile SIFEN	

Complément à la liste des anti-dicotylédones parues dans notre dernier bulletin :

PRADONE TS (carbétamide + diméfuron) : 3,5 - 4 kg :

- . A partir du stade 6 feuilles vraies (B6) des colzas sains et bien implantés.
 - . Application possible sur sol gelé
 - . Action sur dicotylédones :
 - * efficace sur véronique, matricaire, stellaire, coquelicot, lamier
 - * irrégulier sur pensée, gaillet
- insuffisant sur sanve.

CEREALES :

- Desherbage de pré-levée :

En Lorraine, le desherbage de pré-levée est la solution la mieux adaptée aux semis précoces (septembre, octobre), surtout si les parcelles sont régulièrement envahies par les graminées et si la portance des sols au printemps est parfois aléatoire.

Il présente de nombreux avantages :

- . élimine toute concurrence dès la levée des céréales,
- . permet un rattrapage ultérieur en cas d'échec,
- . les conditions de l'automne sont souvent plus favorables que celles du printemps (portance du sol, températures, temps de travaux,...),
- . en cas d'agressivité du produit, la céréale a davantage de temps pour "récupérer".

Le desherbage sera d'autant plus efficace que certaines conditions auront été respectées :

- . lit de semence bien préparé : absence de grosses mottes et de débris végétaux,
- . semences enterrées régulièrement (3 cm environ),
- . sol ni trop humide, ni trop sec : dans le premier cas, il y a risque de phytotoxicité, le produit pouvant se retrouver au niveau de la semence, dans le second cas, il y a risque d'inefficacité, le produit ne pouvant être absorbé par la mauvaise herbe,
- . la dose de produit doit être adaptée à la teneur du sol en argile : en sol léger, on appliquera les doses conseillées les plus faibles,
- . le produit sera choisi en fonction des espèces de mauvaises herbes habituellement présentes dans la parcelle, tout en sachant que le gaillet n'est pas contrôlé par ces spécialités,
- . tout travail superficiel (roulage) sera arrêté après le traitement,
- . enfin, rappelons que certaines variétés sont sensibles au chlortoluron (DICURAN, CHLORTOLUREE, CIBRAL, ...), notamment : Arminda, Pernel, Corin, Feuvert...

La liste des produits a été diffusée dans le dépliant vert ITCF-SPV en cours de campagne.